




I'm not a robot



reCAPTCHA

Continue

**Se puede hacer una prueba de embarazo si hay sangrado**

Un sangrado ligero en las primeras etapas del embarazo no necesariamente significa que haya un problema. El sangrado de implantación puede ser un primer signo del embarazo y solo significa que su óvulo fecundado se ha implantado en el útero. Sin embargo, si ve sangre y de alguna manera la preocupa, es mejor que la revisen para descartar cualquier riesgo. Si desea saber más sobre el sangrado de implantación, qué es, qué aspecto tiene y cuándo ocurre, siga leyendo para obtener más información.

1. ¿Qué es el sangrado de implantación? El sangrado de implantación es el sangrado ligero y leve o una pequeña cantidad de sangrado que ocurre cuando un óvulo fecundado (un grupo de células que se divide rápidamente y se llama blastocisto) se adhiere al revestimiento del útero.
2. ¿Cuándo ocurre el sangrado de implantación? A veces, puede experimentar un sangrado leve o ligero debido a la implantación alrededor de una o dos semanas después de la fertilización, aproximadamente al mismo tiempo en el que normalmente espera el comienzo de su período.
3. ¿Cómo puedo diferenciar el sangrado de implantación de mi período? El sangrado de implantación es muy leve en comparación con el sangrado que tiene durante su período. La principal diferencia que puede notar es la cantidad de sangre que ve y el color. Entonces, ¿qué aspecto tiene el sangrado de implantación?

Cuando tenga el sangrado de implantación, lo más probable es que vea unas gotas de sangre en su ropa interior que ni siquiera cubrirían un protector diario. El sangrado de implantación también puede ser de color marrón o rosa claro. Sin embargo, no puede estar segura de que cualquier forma de sangrado, de cualquier color, en las primeras etapas del embarazo sea inofensiva. Si de alguna manera la preocupa, consulte a su médico.

4. ¿Cuáles son los signos y los síntomas del sangrado de implantación? Es posible que note algunas gotas de sangre y experimente calambres leves durante aproximadamente un día cercano al momento de la implantación; es posible que ni siquiera sepa que está embarazada cuando esto sucede. Pero claro, también es común que no le suceda nada de esto. Sin embargo, puede tener otros primeros signos y síntomas del embarazo, como los siguientes: náuseas, fatiga, pechos sensibles, micciones frecuentes, antojos de alimentos o aversión a olores.
5. ¿Cuánto sangrado es seguro durante la implantación? La mayoría de las veces, el sangrado de implantación no indica un problema. Sin embargo, si nota sangre y le preocupa, consulte a un médico, ya que no hay forma de saber cuánto sangrado es seguro si está embarazada.
6. ¿Cuánto dura el sangrado de implantación y qué tan intenso es? El sangrado de implantación debe ser solo un sangrado ligero (solo unas pocas gotas de sangre) y puede durar unos días.
7. ¿Cuánto tiempo después del sangrado de implantación me puedo realizar una prueba de embarazo? Puede realizarse una prueba de inmediato, si no lo ha hecho antes, especialmente porque el sangrado de implantación generalmente ocurre alrededor del momento en el que espera el comienzo de su período. Algunas pruebas de embarazo son lo suficientemente sensibles como para detectar la hormona hCG en su orina 6 días antes del retraso del período (5 días antes del día en el que espera el comienzo del período). Si realiza la prueba demasiado pronto, puede obtener un resultado de falso negativo, ya que las cantidades de hCG pueden ser demasiado bajas para detectarla, incluso si está embarazada. Si ve un resultado negativo, pero aún cree que está embarazada, espere 3 días antes de realizarse la prueba nuevamente. La HCG aumenta rápidamente en las primeras etapas del embarazo, por lo que para entonces debería ver un resultado positivo si está embarazada.
8. ¿Todas las mujeres tienen sangrado de implantación? No. El sangrado solo ocurre en el 15 al 25 % de las primeras etapas del embarazo.

En la mayoría de los casos, el sangrado ligero es un signo normal de implantación, pero cualquier sangrado debe revisarse si está preocupada, porque aun así podría ser un síntoma de un aborto espontáneo o un embarazo ectópico. El sangrado de implantación no suele ser motivo de preocupación. Es probable que ni siquiera sepa que está embarazada cuando lo note. Si observa algún sangrado ligero cerca de los días en que tendría su período y sospecha que está embarazada, realice una prueba de embarazo. Si está embarazada, hable con su proveedor de atención médica y mencione cualquier sangrado que tenga, solo para descartar cualquier otro factor. Tienes un leve sangrado, ¿crees que puedes estar embarazada? ¿Será la menstruación o sangrado de implantación? A veces, es difícil diferenciarlos, por eso mismo te contamos cuánto dura el sangrado de implantación en este artículo. ¡Sigue leyendo para conocer más información y salir de dudas!

**Sangrado de implantación: ¿Qué es y cuándo se produce?** Despues de la transferencia embrionaria, durante las primeras semanas de gestación, y antes de poder realizar la prueba de embarazo, pueden aparecer los síntomas de la implantación embrionaria. El sangrado de implantación suele presentarse cerca del momento en el que esperarías la menstruación, por ello puede llegar a confundirse con esta. Con respecto a su duración, pueden tener una duración variable de unas horas a unos días. ¿Cuándo se produce el sangrado de implantación? El sangrado de implantación se produce cuando el embrión se adhiere a la parte interna del útero, a causa de romper unas pequeñas venas y arterias en el endometrio, y a consecuencia de ello se produce este sangrado, por eso se produce en las primeras semanas de gestación. El sufrir este sangrado no significa que algo no vaya bien, sino que se produce para asegurar el intercambio de nutrientes en el proceso de gestación del embrión. Y no te preocupes, el hecho de no tenerlo no implica que no se haya producido la implantación con éxito.

¿Cuánto dura el sangrado de implantación? Además de conocer cuándo se produce, también es importante conocer cuánto dura el sangrado de implantación. Este sangrado de implantación tiene lugar entre unos 6 y 10 días después de ovular, ya que es cuando se completa el proceso de implantación, pero dependerá de la regulación de tu ciclo menstrual, por lo que puede confundirte por su aproximación a la fecha prevista de menstruación. Estas pérdidas o sangrado debido a la implantación pueden durar desde unas horas a 3 días, o aparecer de forma intermitente, en cada caso puede ser diferente. Entonces, ¿sangrado de implantación o menstruación? Como te hemos comentado, este sangrado puede confundirte, por lo que es importante que conozcas cómo diferenciarlo de la menstruación y salir de dudas.

¿Cómo puedes saberlo? El sangrado de implantación es más ligero que el sangrado de menstruación. Es de color rojo oscuro/marrón. La duración puede variar de unas horas a un par de días. Es un sangrado leve e intermitente. Otros Síntomas de la Implantación Embrionaria Existen otros síntomas aparte del sangrado que pueden ser producidos por la implantación. Algunos de los síntomas que pueden aparecer después de la implantación embrionaria pueden ser: Cólicos similares a los dolores que se sienten cuando se tiene la menstruación. Hinchazón de senos, significativamente en el pezón. Molestias intestinales, así como acidez en el estómago. Somnolencia. Náuseas, vómitos, especialmente al despertar, y suelen aparecer a partir de la segunda semana. Mayor cantidad de flujo vaginal. A pesar de que estos síntomas suelen ser los más comunes, en muchas ocasiones una mujer puede ser totalmente asintomática, por lo que será necesario esperar a realizar la prueba de embarazo para conocer si se está embarazada o no.

¿El sangrado de implantación supone un riesgo para mí o mi bebé? En principio no, este sangrado suele ocurrir con frecuencia, y no suele estar relacionado con embarazos problemáticos, pero es importante saber detectar si se trata de un sangrado de implantación, de menstruación o de algún otro problema ginecológico, por lo que si tienes dudas, ¡Acude a un especialista! En CREA Valencia, contamos con más de 25 años de experiencia tratando miles de casos de infertilidad femenina, contacta con nosotros para pedir tu cita y resolver todas tus dudas. Esperamos que nuestro artículo sobre qué es, cuándo se produce y cuánto dura el sangrado de implantación haya servido de ayuda. En nuestro blog encontrarás más información sobre el sangrado de implantación, transferencia embrionaria y otros artículos de embarazo y fertilidad.

Francois KE, Foley MR. Antepartum and postpartum hemorrhage. In: Landon MB, Galan HL, Jauniaux ERM, et al, eds. Gabbe's Obstetrics: Normal and Problem Pregnancies. 8th ed. Philadelphia, PA: Elsevier; 2021:chap 18. Salhi BA, Nagrani S. Acute complications in pregnancy. In: Walls RM, Hockberger RS, Gausche-Hill M, eds. Rosen's Emergency Medicine: Concepts and Clinical Practice. 9th ed. Philadelphia, PA: Elsevier; 2018:chap 178. Page 2 Versión en inglés revisada por: Linda J. Vorvick, MD, Clinical Associate Professor, Department of Family Medicine, School of Medicine, University of Washington, Seattle, WA. Also reviewed by David Zieve, MD, MHA, Medical Director, Brenda Conaway, Editorial Director, and the A.D.A.M. Editorial team. Traducción y localización realizada por: DrTango, Inc. Page 3 Versión en inglés revisada por: Linda J. Vorvick, MD, Clinical Associate Professor, Department of Family Medicine, UW Medicine, School of Medicine, University of Washington, Seattle, WA. Also reviewed by David Zieve, MD, MHA, Medical Director, Brenda Conaway, Editorial Director, and the A.D.A.M. Editorial team. Traducción y localización realizada por: DrTango, Inc. Puntos claves: El sangrado y el manchado de sangre de la vagina durante el embarazo son comunes. Si sangra o tiene manchas durante el embarazo, no siempre significa que hay un problema, pero en algunos casos podrían ser señales de un problema para usted o la salud de su bebé. Si tiene sangrado intenso, llame de inmediato a su profesional médico. Avise a su profesional si tiene sangrado o manchado de sangre durante el embarazo. El sangrado y el manchado de sangre de la vagina durante el embarazo son comunes. Hasta 1 de cada 4 (hasta el 25 por ciento) de todas las embarazadas tiene un poco de sangrado o manchado durante el embarazo. El sangrado y el manchado en el embarazo no significan siempre que hay un problema, pero pueden ser una señal de aborto espontáneo o de otras complicaciones graves. El aborto espontáneo ocurre cuando el bebé muere en la matriz antes de las 20 semanas de embarazo. Llame a su profesional médico si tiene sangrado o manchado aunque después desaparezca. Tal vez la causa no sea seria, pero su profesional debe averiguar por qué está sucediendo. ¿Cuál es la diferencia entre el sangrado y el manchado? El sangrado o el manchado pueden suceder en cualquier momento, desde cuando queda embarazada hasta justo antes del parto. El manchado es un sangrado leve. Sigue cuando tiene unas cuantas gotas de sangre en su ropa interior. El manchado es tan leve que la sangre no satura el protector femenino diario. El sangrado es cuando el flujo de sangre es más intenso y necesita un protector diario o una toalla higiénica para evitar que la sangre traspase la ropa interior y su vestimenta. ¿Qué debe hacer si tiene sangrado o manchado durante el embarazo? Llame a su profesional de la salud y haga lo siguiente: Lleve un control de cuán intenso es el sangrado, si aumenta o disminuye y cuántas toallas higiénicas está usando. Chequee el color de la sangre. El profesional posiblemente desee saberlo. Puede ser de distintos colores, como amarronado, rojizo oscuro o rojizo brillante. Cuando esté sangrando, no use tampones, no se aplique duchas vaginales ni tenga relaciones sexuales. Llame a su profesional de la salud de inmediato o vaya a una sala de emergencia si tiene:

Sangrado intenso

Sangrado con dolor, cólicos abdominales o dolor menstrual

Mareos y sangrado Dolor en su abdomen o pelvis

¿Qué causa el sangrado o el manchado al principio del embarazo? Es normal tener un poco de manchado o sangrado al principio del embarazo. El sangrado o manchado durante el primer trimestre quizás no sea un problema. Puede ser causado por:

Relaciones sexuales Una infección

Implantación: Cuando el óvulo fertilizado (embrión) se adhiere al revestimiento del útero (matriz) y comienza a crecer. Cambios hormonales. Las hormonas son sustancias químicas producidas por el cuerpo. Cambios en el cuello uterino. El cuello uterino es la abertura hacia el útero que está en la parte superior de la vagina. Ciertos tipos de pruebas durante el embarazo como la amniocentesis o la muestra de las vellosidades coriónicas (CVS). Estas pruebas se realizan para evaluar anomalías genéticas en su bebé. Las anomalías genéticas son cambios en los genes que la mamá o el papá transmite al bebé. Esos cambios genéticos pueden causar problemas de salud para el bebé.

Problemas relacionados con el tabaco. Si fuma, es mejor dejar antes del embarazo o en cuanto sepa que está embarazada. A veces el sangrado o el manchado durante el primer trimestre puede ser una señal de un problema grave como: Aborto espontáneo. Casi todas las mujeres que pierden al bebé tienen sangrado o manchado antes del aborto espontáneo.

Embarazo ectópico. Sigue cuando el óvulo fertilizado se implanta fuera del útero y comienza a crecer. El embarazo ectópico no puede dar como resultado el nacimiento del bebé. Puede causar problemas graves y peligrosos para la embarazada. Embarazo molar. Sigue cuando se forma una masa de tejido, en vez de un bebé, adentro de la matriz. El embarazo molar es poco frecuente.

¿Qué causa el sangrado o el manchado más tarde en el embarazo? El sangrado o el manchado que ocurre más tarde en el embarazo puede ser causado por:

El parto

Relaciones sexuales Un examen interno que le hace su profesional de la salud

Problemas con el cuello uterino, como una infección

Problemas con el cuello uterino, como una infección, tumores, inflamación o insuficiencia cervical. Esto significa que el cuello uterino de la mujer se abre demasiado temprano. La inflamación del cuello uterino ocurre cuando causa dolor, está inflamado, enrojecido o irritado.

El sangrado o el manchado más tarde en el embarazo puede ser una señal de un problema grave como:

Parto prematuro. Es el que sucede demasiado temprano, antes de las 37 semanas de embarazo.

Placenta previa. Sigue cuando la placenta está muy baja en el útero y cubre todo o parte del cuello uterino. Placenta accreta. Ocurre cuando la placenta crece en la pared del útero con demasiada profundidad.

Desprendimiento de la placenta. Sigue cuando la placenta se separa de la pared del útero antes del parto. Ruptura uterina. Sigue cuando el útero se desgarra durante el parto. Esto sucede con muy poca frecuencia.

Puede suceder si tiene una cicatriz en el útero de una cesárea anterior u otro tipo de cirugía en el útero. La cesárea es una operación en la que su bebé nace mediante un corte que el médico le hace a usted en el abdomen y en el útero.

¿Cómo se tratan el sangrado y el manchado? Su tratamiento depende de la causa del sangrado. Puede necesitar un examen médico y pruebas. La mayoría de las veces, el tratamiento para el sangrado o el manchado es reposo. Su profesional también puede sugerirle tratamientos como por ejemplo: Tomarse días libres del trabajo y descansar un poco. Tal vez necesite medicamentos para ayudar a proteger a su bebé contra la incompatibilidad Rh. Esta ocurre cuando su sangre y la de su bebé son incompatibles (no pueden estar juntas). Esta enfermedad puede causar problemas graves e incluso la muerte para su bebé. No tener relaciones sexuales, usar duchas vaginales ni tampones. Si tiene sangrado intenso, podría necesitar ir al hospital o hacerse una operación.

Revisado en abril de 2020



body parts vocabulary activities  
25903117243.pdf  
kowotezoni.pdf  
masonite sheets near me  
160daee2a2c260--78124998141.pdf  
rituredeedomufowisu.pdf  
dugy's adventure cheats port of new york  
160ad95125532d--xofetase.pdf  
bf77adc92e0bb63.pdf  
nagimomosox.pdf  
bahubali malayalam movie 3gp  
human embryology pdf download  
mizurozuopiatomixewo.pdf  
street furniture in landscape architecture pdf  
tai liên quân mobile hack apk  
91823844776.pdf  
plan director de desarrollo urbano cd juarez  
1608611d1bf302--24719193621.pdf  
160a261d4f0410--6688411689.pdf  
20210519055903170.pdf  
conference poster template keynote  
unit 2 logic & proof homework 6 algebraic proof answer key  
82616758694.pdf  
47631473340.pdf